AINE EN PERROS Y GATOS · CÁPSULA 1 · RESUMEN

¿Este paciente puede recibir un AINE?

Objetivo: decidir si un perro o un gato es candidato a un AINE y reconocer cuándo no lo es.

Primero la clínica, después el laboratorio

La valoración clínica decide. El laboratorio complementa lo que ya viste en el paciente: no lo reemplaza.

Seis condiciones antes de indicar un AINE

1 Hidratado y normotenso

El paciente tiene que estar bien hidratado y con la presión arterial normal.

2 Riñón e hígado conservados

No es candidato: mucosas ictéricas, poliuria y polidipsia marcadas, urea o creatinina el doble o el triple de lo normal.

Puede serlo: paciente clínicamente normal con urea, creatinina o fósforo apenas por encima del rango.

Ojo con las enzimas: la ALT sube con un traumatismo mínimo y la fosfatasa alcalina puede estar muy alta en un animal sano.

3 Sin coagulopatías

La pregunta práctica: **¿sangra mucho y sin motivo?** Entonces no es candidato. Si coagula bien después de una herida, puede recibirlo.

Importan las coagulopatías genéticas (hemofilia, von Willebrand). No se piden estudios de coagulación de rutina. La aspirina es el único AINE del grupo que anula por completo la agregación plaquetaria: tarda **7 días** en recuperarse.

4 Sin enfermedad digestiva

Vómito crónico o diarrea de causa desconocida: no es el candidato más adecuado.

Vomita porque come pasto: no hay inconveniente, y no hace falta protector gástrico.

Si el AINE le cae mal, el vómito suele aparecer a las **4–5 h** en el perro y a las **1,5–2 h** en el gato.

5 Pulmón y corazón sin enfermedad importante

Respiratorio: el AINE bloquea la prostaglandina E2, que ayuda a la broncodilatación. Con asma, bronquitis, broncoespasmo o convivencia con fumadores puede haber una dificultad respiratoria grave. Alcanzan la anamnesis y la auscultación.

Cardíaco: riesgo de microtrombosis; en el gato puede terminar en tromboembolismo.

6 Sin corticoides

«No pasa nada… hasta que pasa.»

Es una combinación frecuente en perros en Latinoamérica. Puede dañar estómago, intestino, hígado, riñón, respiración y corazón. **En el gato suele ser fatal.**

Si recibe un corticoide, no es momento de un AINE.

Para llevarse

1. Primero la clínica, después el laboratorio.
2. Antes de indicar un AINE, repasá las seis condiciones.
3. Si el paciente recibe un corticoide, no es momento de un AINE.

Para ampliar: qué dicen las guías

Antes de un tratamiento prolongado, las guías recomiendan anamnesis, examen físico y análisis de sangre y orina (AAHA, 2022; WSAVA, 2022).

En el gato con enfermedad renal crónica estable, la guía felina admite el AINE en estadios iniciales, a dosis baja y con controles estrechos (ISFM/AAFP, 2024).

Contenido: Esp. MV Marcelo Zysman · Adaptación didáctica: VetesWeb · Próxima cápsula: Perro no es gato